nébih
termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság
1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Telefon: +36 (1) 309 1000
ppp.registration@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

Ikt. sz.: **6300/2175-2/2022.**
Tárgy: **Verimark rovarölő szer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása
Ügyintéző: Bodzás Annamária
Oldalak száma: 7
Mellékletek: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

---

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,** mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), az **FMC-Agro Hungary Kft.** (1027 Budapest, Ganz u. 16. II. em.) ügyfélnek a **Verimark rovarölő szer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének a Franciaország által kiadott engedély kölcsönös elismerésén alapuló módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

Az engedélyező hatóság a **Verimark rovarölő szer** *6300/13566-1/2019. NÉBIH számú* forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokiratát – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint adja ki:

I. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	Kezelések évenkénti maximális száma	Két kezelés közt eltelt minimális időtartam (nap)	Dózis	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
szamóca (szabadföldi)	szamóca-bimbólikasztó	**2**	**7**	**0,375 l/ha**	két leveles állapottól a 2. betakarításig (BBCH 12-89) legkésőbb augusztus 15-ig
szamóca (zárt termesztő berendezés)	bagolylepkék, zöld őszibarack-levéltetű, nyugati virágtripsz, szamóca-bimbólikasztó	**4**	**7**	**0,375 l/ha**	két leveles állapottól a 2. betakarításig (BBCH 12-89) januártól decemberig
karfiol, brokkoli, fejes káposzta, bimbóskel (szabadföldi)	kis káposztalégy	**1**	**-**	**15 ml/1000 db növény**	ültetés előtt két lombleveles állapottól az öt lombleveles állapotig (BBCH 12-15) legkésőbb augusztus 15-ig

uborka, cukkini, sárgadinnye, görögdinnye (zárt termesztő berendezés)	bagolylepkék, aknázólegyek, uborka-levéltetű, dohányliszteske, üvegházi molytetű, nyugati virágtripsz, dohánytripsz	**4**	**7**	**0,375-0,5 l/ha**	két leveles állapottól a teljes érésig (BBCH 12-89) januártól decemberig
zöldbab (zárt termesztő berendezés)	bagolylepkék, uborka-levéltetű, dohányliszteske, üvegházi molytetű, nyugati virágtripsz, dohánytripsz	**2**	**7**	**0,375-0,5 l/ha**	két leveles állapottól a teljes érésig (BBCH 12-89) januártól decemberig
fejes saláta (zárt termesztő berendezés)	bagolylepkék	**3**	**7**	**0,375-0,5 l/ha**	két leveles állapottól a teljes érésig (BBCH 12-89) januártól decemberig
paprika (zárt termesztő berendezés)	paradicsommoly, bagolylepkék, aknázólegyek, uborka-levéltetű, dohányliszteske, üvegházi molytetű, nyugati virágtripsz, dohánytripsz	**4**	**7**	**0,375-0,5 l/ha**	két leveles állapottól a teljes érésig (BBCH 12-89) januártól decemberig
paradicsom, tojásgyümölcs (zárt termesztő berendezés)	paradicsommoly, bagolylepkék, aknázólegyek, uborka-levéltetű, dohányliszteske, üvegházi molytetű, nyugati virágtripsz, dohánytripsz	**4**	**7**	**0,375-0,5 l/ha**	két leveles állapottól a teljes érésig (BBCH 12-89) januártól decemberig

Előírt növényvédelmi technológia:

Szabadföldi szamócában a szamóca-bimbólikasztó ellen csepegtető öntözéssel kell kijuttatni a készítményt a gyökerek közelébe az öntözési periódus első harmadában, a tojásrakás kezdetére időzítve.
Zárt termesztő berendezésben termesztett szamócában talajon, illetve szilárd termesztő közegben történő termesztés során a kártevők ellen előrejelzés alapján és növényvizsgálat ismeretében csepegtető öntözéssel kell kijuttatni a készítményt a gyökerek közelébe az öntözési periódus első harmadában. Vízkultúrás termesztés esetében a tápoldatozásra használt vízbe kell a készítményt egyenletesen bekeverni.
Szabadföldi fejes káposztában, karfiolban, brokkoliban és bimbóskelben a tavaszi káposztalégy ellen a palántákat kell kiültetés előtt felszívatni.

Zárt termesztő berendezésben termesztett uborkában, cukkiniben, sárgadinnyében, görögdinnyében, zöldbabban, fejes salátában, paprikában, paradicsomban és tojásgyümölcsben talajon, illetve szilárd termesztő közegben történő termesztés során a kártevők ellen előrejelzés alapján és növényvizsgálat ismeretében csepegtető öntözéssel kell kijuttatni a készítményt a gyökerek közelébe az öntözési periódus első harmadában. Vízkultúrás termesztés esetében a tápoldatozásra használt vízbe kell a készítményt egyenletesen bekeverni.

Az öntöző víz és a tápoldat kémhatását pH 5-6 közé kell beállítani.

Kézi permetező berendezéssel munkaegészségügyi okokból tilos kijuttatni!

A ciántraniliprol hatóanyag az International Resistance Action Committee (IRAC) besorolása szerint az **28** *Rianodin receptor modulátorok* főcsoport *Diamidok* csoportjába tartozik.
A rezisztencia kialakulásának megakadályozása érdekében e készítményt, vagy másik, a diamidok csoportjába tartozó hatóanyagot (pl.: klórantraniliprol, ciántraniliprol, flubendiamid) tartalmazó készítményt ne alkalmazza egymás után, eltérő hatásmechanizmusú, más inszekticiddel való kezelés útján történő megszakítás nélkül.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

II. Az engedélyokirat 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD_{50} értéke (patkányon):	**>2000 mg/ttkg**
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	**kifejezetten veszélyes**
Méhveszélyesség:	**kifejezetten kockázatos**
Méhveszélyesség toxicitás alapján:*	*kifejezetten veszélyes*
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján:*	*kifejezetten kockázatos*
Tűzveszélyességi besorolás:	**nem jelölésköteles**

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram

Figyelmeztetés **Figyelem**

Figyelmeztető mondatok/H-mondatok:

H400* Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

---

* Címkén nem feltüntetendő adat

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű, védőruha használata kötelező.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH208	*Benzizotiazolinont* tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401	Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

5.2. Különleges S-mondatok:

SP 1	A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

Szabadföldi és nyitott üvegházi felhasználás:

SPe 2	A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, K_A<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe 3	A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektől **20 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!
SPe 8	Méhekre veszélyes! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzó kultúrában nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén vagy abban az esetben, ha a házi méhek a kezelendő területet bármely okból látogatják nem alkalmazható!

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Zárt üvegházi felhasználás:

A betelepített poszméhek és egyéb hasznos élő szervezetek érzékenyek lehetnek a növényvédő szerre. Kerülje a szükségtelen expozíciót!

5.4. várakozási idők:

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)
5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
szamóca (szabadföldi és zárt termesztő berendezés)	1
karfiol, brokkoli, fejes káposzta, bimbóskel (szabadföldi)	előírás szerinti kijuttatás esetén nem szükséges
uborka, cukkini, sárgadinnye, görögdinnye (zárt termesztő berendezés)	1
zöldbab, fejes saláta, paprika, paradicsom, tojásgyümölcs (zárt termesztő berendezés)	1

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés

5.5.1.1. Előkészítőknek: védőkesztyű, munkaruha (hosszú szárú nadrág, hosszú ujjú felső, zárt cipő)

5.5.1.2. Kijuttatóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú szárú nadrág, hosszú ujjú felső, zárt cipő).
Zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges.

5.5.2.Elsősegélynyújtás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani és orvosi ellátást biztosítani .
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. *Tilos hánytatni!*

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: Specifikus antidótuma: nincs.

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az engedély módosítási eljárás díja 650.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.
A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

Az ügyfél hazai képviselete 2022. augusztus 02. napján benyújtott kérelmében a **Verimark rovarölő szer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélynek módosítását kérte uborka, tökfélék, szamóca, zöldbab, saláta, paprika, paradicsom és tojásgyümölcs kultúrában történő kiterjesztés céljából.

Az ügyfél a kérelem alátámasztására benyújtotta a 2022. június 20-án kiadott 2199998 számú francia engedélyokiratot francia és angol nyelven és a Franciaország illetékes hatóságának interzonális értékelését.

Az engedélyező hatóság a kérelmet megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelem benyújtása megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A növényvédő szerek engedélyezésének közösségi szabályairól a *növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117 EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 1107/2009/EK rendelet* (továbbiakban: *EK Rendelet*) rendelkezik.

Az engedélyező hatóság a kisebb jelentőségű felhasználásokra benyújtott kérelem alapján indult eljárásban megállapította, hogy fennállnak az engedély módosításának *az EK Rendeletben* meghatározott feltételei, ezért az *EK Rendelet 51. cikke,* továbbá a *növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet* (a továbbiakban: *R.*) eljárásra vonatkozó részletszabályai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a **Verimark rovarölő szer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kisebb jelentőségű felhasználásokra történő kiterjesztése mellett döntött.

A címkézésre vonatkozó rendelkezés az *EK rendelet 65. cikkén,* valamint az *EK rendeletnek a növényvédő szerek címkézésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról* szóló *547/2011/EU rendeleten,* továbbá a *R. 30. §-án* alapul.

Jelen eljárás díja a *Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet* 1. melléklet 8.5.1. és a 8.11.1. pontja alapján került megállapításra.

Az engedélyező hatóság határozatát a *Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 3. § (1)* bekezdésében, és *a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 12.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének d) pontjában és a (2) bekezdésének a) pontjában* biztosított jogkörében eljárva, az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1)* megfelelően hozta.

A jogorvoslat lehetősége az *Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése,* továbbá *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §,* valamint *az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pontja* alapján biztosított.

Budapest, 2022. október 15.

Dr. Oravecz Márton

elnök

nevében és megbízásából

Dr. Németh Csilla

osztályvezető

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal P.H. 55.

Kapja:
1. Ügyfél
2. Irattár

(459/2022.)

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000
E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

1.1. Engedélyokirat száma:	**6300/13566-1/2019. NÉBIH**
1.2. Növényvédő szer neve:	**Verimark**
1.3. Engedélyokirat érvényessége:	**2027. szeptember 14.**
1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:	**FMC-Agro Hungary Kft.** 1027 Budapest, Ganz u. 16. II. em.
1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:	-

2. A növényvédő szer adatai:

2.1. Növényvédő szer gyártója:	**FMC International Switzerland Sàrl** Chemin de Blandonnet 8 CH-1214, Vernier Svájc
2.2. Növényvédő szer rendeltetése:	rovarölő szer
2.3. Növényvédő szer formulációja:	SC

2.4. Növényvédő szer összetétele:

2.4.1. hatóanyag	*ISO név*	**ciántraniliprol**
	CAS szám	*736994-63-1*
	IUPAC név	*3-bróm-1-(3-klór-2-piridil)-4'-ciano-2'-metil- 6'-(metilkarbamoil)-pirazol-5-karboxanilid*
tiszta hatóanyag részaránya		**200 g/L**

3. Minőségi követelmények:

3.1. Hatóanyag tartalom

3.1.1. ciántraniliprol (HPLC-UV)	18,73± 1,12% (w/w)

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:	Meg kell felelnie az **SC** formuláció FAO követelményeinek.
Tájékoztató jellegű adatok:	**Megjelenés:** törtfehér színű, szagtalan folyadék **pH (1%-os szuszpenzió):** 7,3 **Felületi feszültség (22°C):** 32,2 mN/m (felületaktív anyag) **Relatív sűrűség (20°C):** 1,068 **Tartós habképződés (0,4 %-os szuszpenzió, 1 perc):** 27 ml **Nedves szitamaradék (75 μm):** 0,039% **Kiönthetőségi maradék:** 2,72 %

4. Felhasználásra vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	Kezelések évenkénti maximális száma	Két kezelés közt eltelt minimális időtartam (nap)	Dózis	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
szamóca (szabadföldi)	szamóca-bimbólikasztó	**2**	7	**0,375 l/ha**	két leveles állapottól a 2. betakarításig (BBCH 12-89) legkésőbb augusztus 15-ig
szamóca (zárt termesztő berendezés)	bagolylepkék, zöld őszibarack-levéltetű, nyugati virágtripsz, szamóca-bimbólikasztó	**4**	7	**0,375 l/ha**	két leveles állapottól a 2. betakarításig (BBCH 12-89) januártól decemberig
karfiol, brokkoli, fejes káposzta, bimbóskel (szabadföldi)	kis káposztalégy	**1**	-	**15 ml/1000 db növény**	ültetés előtt két lombleveles állapottól az öt lombleveles állapotig (BBCH 12-15) legkésőbb augusztus 15-ig
uborka, cukkini, sárgadinnye, görögdinnye (zárt termesztő berendezés)	bagolylepkék, aknázólegyek, uborka-levéltetű, dohányliszteske, üvegházi molytetű, nyugati virágtripsz, dohánytripsz	**4**	7	**0,375-0,5 l/ha**	két leveles állapottól a teljes érésig (BBCH 12-89) januártól decemberig
zöldbab (zárt termesztő berendezés)	bagolylepkék, uborka-levéltetű, dohányliszteske, üvegházi molytetű, nyugati virágtripsz, dohánytripsz	**2**	7	**0,375-0,5 l/ha**	két leveles állapottól a teljes érésig (BBCH 12-89) januártól decemberig
fejes saláta (zárt termesztő berendezés)	bagolylepkék	**3**	7	**0,375-0,5 l/ha**	két leveles állapottól a teljes érésig (BBCH 12-89) januártól decemberig
paprika (zárt termesztő berendezés)	paradicsommoly, bagolylepkék, aknázólegyek, uborka-levéltetű, dohányliszteske, üvegházi	**4**	7	**0,375-0,5 l/ha**	két leveles állapottól a teljes érésig (BBCH 12-89) januártól decemberig

	molytetű, nyugati virágtripsz, dohánytripsz				
paradicsom, tojásgyümölcs (zárt termesztő berendezés)	paradicsommoly, bagolylepkék, aknázólegyek, uborka-levéltetű, dohánylisztеske, üvegházi molytetű, nyugati virágtripsz, dohánytripsz	4	7	**0,375-0,5 l/ha**	két leveles állapottól a teljes érésig (BBCH 12-89) januártól decemberig

Előírt növényvédelmi technológia:

Szabadföldi szamócában a szamóca-bimbólikasztóellen csepegtető öntözéssel kell kijuttatni a készítményt a gyökerek közelébe az öntözési periódus első harmadában, a tojásrakás kezdetére időzítve.
Zárt termesztő berendezésben termesztett szamócában talajon, illetve szilárd termesztő közegben történő termesztés során a kártevők ellen előrejelzés alapján és növényvizsgálat ismeretében csepegtető öntözéssel kell kijuttatni a készítményt a gyökerek közelébe az öntözési periódus első harmadában. Vízkultúrás termesztés esetében a tápoldatozásra használt vízbe kell a készítményt egyenletesen bekeverni.
Szabadföldi fejes káposztában, karfiolban, brokkoliban és bimbóskelben a tavaszi káposztalégy ellen a palántákat kell kiültetés előtt felszívatni.
Zárt termesztő berendezésben termesztett uborkában, cukkiniben, sárgadinnyében, görögdinnyében, zöldbabban, fejes salátában, paprikában, paradicsomban és tojásgyümölcsben talajon, illetve szilárd termesztő közegben történő termesztés során a kártevők ellen előrejelzés alapján és növényvizsgálat ismeretében csepegtető öntözéssel kell kijuttatni a készítményt a gyökerek közelébe az öntözési periódus első harmadában. Vízkultúrás termesztés esetében a tápoldatozásra használt vízbe kell a készítményt egyenletesen bekeverni.
Az öntöző víz és a tápoldat kémhatását pH 5-6 közé kell beállítani.

A ciántraniliprol hatóanyag az International Resistance Action Committee (IRAC) besorolása szerint az **28** *Rianodin receptor modulátorok* főcsoport *Diamidok* csoportjába tartozik.
A rezisztencia kialakulásának megakadályozása érdekében e készítményt, vagy másik, a diamidok csoportjába tartozó hatóanyagot (pl.: klórantraniliprol, ciántraniliprol, flubendiamid) tartalmazó készítményt ne alkalmazza egymás után, eltérő hatásmechanizmusú, más inszekticiddel való kezelés útján történő megszakítás nélkül.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD_{50} értéke (patkányon):	**>2000 mg/ttkg**
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	**kifejezetten veszélyes**
Méhveszélyesség:	**kifejezetten kockázatos**
Méhveszélyesség toxicitás alapján:*	*kifejezetten veszélyes*
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján:*	*kifejezetten kockázatos*
Tűzveszélyességi besorolás:	**nem jelölésköteles**

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram

Figyelmeztetés **Figyelem**

Figyelmeztető mondatok/H-mondatok:

H400* Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű, védőruha használata kötelező.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH208 Benzizotiazolinont tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

* Címkén nem feltüntetendő adat

5.2. Különleges S-mondatok:

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

Szabadföldi és nyitott üvegházi felhasználás:

SPe 2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, K_A<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektől **20 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!

SPe 8 Méhekre veszélyes!

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzó kultúrában nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén vagy abban az esetben, ha a házi méhek a kezelendő területet bármely okból látogatják nem alkalmazható!

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Zárt üvegházi felhasználás:

A betelepített poszméhek és egyéb hasznos élő szervezetek érzékenyek lehetnek a növényvédő szerre. Kerülje a szükségtelen expozíciót!

5.4. várakozási idők:

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
szamóca (szabadföldi és zárt termesztő berendezés)	1
karfiol, brokkoli, fejes káposzta, bimbóskel (szabadföldi)	előírás szerinti kijuttatás esetén nem szükséges
uborka, cukkini, sárgadinnye, görögdinnye (zárt termesztő berendezés)	1
zöldbab, fejes saláta, paprika, paradicsom, tojásgyümölcs (zárt termesztő berendezés)	1

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés

5.5.1.1. Előkészítőknek: védőkesztyű, munkaruha (hosszú szárú nadrág, hosszú ujjú felső, zárt cipő)

5.5.1.2. Kijuttatóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú szárú nadrág, hosszú ujjú felső, zárt cipő)
Zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges.

5.5.2.Elsősegélynyújtás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani és orvosi ellátást biztosítani .
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. *Tilos hánytatni!*

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: Specifikus antidótuma: nincs.

6. Kiszerelés, csomagolás:

6.1. Kiszerelés térfogata/tömege: **100 ml, 250ml, 500 ml, 1000 ml**

6.2. Csomagolószer anyaga: HDPE palack

7. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.
Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: **3 év**

8. Forgalmazási kategória:

II.

Budapest, 2022. október 15.

Dr. Oravecz Márton

elnök

nevében és megbízásából

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Dr. Németh Csilla

osztályvezető

P.H.

CÍMKESZÖVEG

Információk, magyarázatok	**Címkén feltüntetendő kifejezések és információk** tartalmi, ill. formai követelményei
Növényvédő szer neve	**VERIMARK**
Szerforma (formuláció)	szuszpenzió koncentrátum (**SC**)
Hatóanyag megnevezése, koncentrációja (g/l, vagy g/kg **és** ez tömegszázalékban is kifejezve; m/m%)	**ciántraniliprol** 200 g/l, (18,7% (m/m))
Rendeltetése a felhasználás célja szerint	rovarölő szer
Forgalomba hozatali engedély száma (Az engedélyokirat kiadásakor kapott határozat számának szerepeltetése kötelező.)	**6300/13566-1/2019. NÉBIH**
Forgalmazási kategória megjelölése	**Forgalmazási kategória: II.**
Az engedélyokirat tulajdonosa és forgalmazó (név, cím, telefonszám)	**Az engedélyokirat tulajdonosa és forgalmazó:** **FMC-Agro Hungary Kft.** 1027 Budapest, Ganz utca 16. Tel.: +36 1 336 2120
A növényvédő szer gyártója (név, cím)	**A növényvédő szer gyártója:** **FMC International Switzerland Sárl** Chemin de Blandonnet 8 CH-1214, Vernier Svájc
Gyártási idő (nap, hó, év, vagy év, hó, nap) válasszon **Gyártási szám**	**Gyártási idő** (nap/hó/év): A csomagoló burkolaton található. **Gyártási szám:** A csomagolóburkolaton található.
Eltarthatóság (eltér az engedélyokiratban szereplő szövegtől, ezt kérjük használni)	**Eltarthatóság**: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3** év.
Kiszerelési egység (valamennyi kiszerelési egység feltüntetendő)	**Nettó tartalom: 100 ml, 250ml, 500 ml, 1000 ml**
EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI	
Veszélyt jelző piktogramok	 **Figyelem**
Figyelmeztetés	A készítmény p.o. LD_{50} értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg **Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles** **Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes** **Méhveszélyesség: kifejezetten kockázatos**
H-, P- és különleges S-mondatok és Kiegészítő veszélyességi információk (EUH401-es mondatot a címke elején	**H410** Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

kérjük feltenni a kód nélkül; lásd: kötelezően feltüntetendő mondatok alább)

(Abban az esetben, ha készítmény besorolása H mondatot nem tartalmaz, akkor a címkeszövegen nem feltüntetendő a címsor.
A P102, P270 mondatok az *I. és a II. forgalmi kategóriák esetében választhatóak,* de *III. forgalmi kategória esetén kötelező* feltüntetni.
Amennyiben az engedélyokiratban lévő munkaegészségügyi előírások lefedik az adott P mondatot, akkor az elhagyható.)

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően kezet kell mosni
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű, védőruha használata kötelező.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Különleges S-mondatok:

SP 1	A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

Szabadföldi és nyitott üvegházi felhasználás:

SPe 2	A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, K_A<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe 3	A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektől **20 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!
SPe 8	Méhekre veszélyes! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzó kultúrában nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén vagy abban az esetben, ha a házi méhek a kezelendő területet bármely okból látogatják nem alkalmazható!

EUH 208	Benzizotiazolinont tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Egyéb környezetvédelmi előírások:
<u>Zárt üvegházi felhasználás:</u>

A betelepített poszméhek és egyéb hasznos élő szervezetek érzékenyek lehetnek a növényvédő szerre. Kerülje a szükségtelen expozíciót!

Egyéb környezetvédelmi előírások: Ha nincs egyéb környezetvédelmi előírás, a következő mondatot kell szerepeltetni:

„Az előírt kockázatcsökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges."	
Munkaegészségügyi óvórendszabályok	**Munkaegészségügyi óvórendszabályok:** *Egyéni védőfelszerelés:* *Előkészítőknek:* védőkesztyű, munkaruha (hosszú szárú nadrág, hosszú ujjú felső, zárt cipő) *Kijuttatóknak:* védőkesztyű, munkaruha (hosszú szárú nadrág, hosszú ujjú felső, zárt cipő) (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges) Elsősegélynyújtás: Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani és orvosi ellátást biztosítani . Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. *Tilos hánytatni!* *Terápia:* tüneti megfigyelő kezelés *Ellenanyag:* specifikus antidótuma nincs
Várakozási idők (napokban megadva)	**Várakozási idők:** Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: • **uborka, cukkini, sárgadinnye, görögdinnye, zöldbab, fejes saláta, paprika, paradicsom, tojásgyümölcs, szamóca: 1 nap,** • **karfiol, brokkoli, fejes káposzta, bimbóskel:** előírás szerinti kijuttatás esetén nem szükséges

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Kultúra	Károsító	Kezelések évenkénti maximális száma	Két kezelés közt eltelt minimális időtartam (nap)	Dózis	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
szamóca (szabadföldi)	szamóca-bimbólikasztó	**2**	**7**	**0,375 l/ha**	két leveles állapottól a 2. betakarításig (BBCH 12-89) legkésőbb augusztus 15-ig

szamóca (zárt termesztő berendezés)	bagolylepkék, zöld őszibarack-levéltetű, nyugati virágtripsz, szamóca-bimbólikasztó	4	7	**0,375 l/ha**	két leveles állapottól a 2. betakarításig (BBCH 12-89) januártól decemberig
karfiol, brokkoli, fejes káposzta, bimbóskel (szabadföldi)	kis káposztalégy	1	-	**15 ml/1000 db növény**	ültetés előtt két lombleveles állapottól az öt lombleveles állapotig (BBCH 12-15) legkésőbb augusztus 15-ig
uborka, cukkini, sárgadinnye, görögdinnye (zárt termesztő berendezés)	bagolylepkék, aknázólegyek, uborka-levéltetű, dohánylisztéke, üvegházi molytetű, nyugati virágtripsz, dohánytripsz	4	7	**0,375-0,5 l/ha**	két leveles állapottól a teljes érésig (BBCH 12-89) januártól decemberig
zöldbab (zárt termesztő berendezés)	bagolylepkék, uborka-levéltetű, dohánylisztéke, üvegházi molytetű, nyugati virágtripsz, dohánytripsz	2	7	**0,375-0,5 l/ha**	két leveles állapottól a teljes érésig (BBCH 12-89) januártól decemberig
fejes saláta (zárt termesztő berendezés)	bagolylepkék	3	7	**0,375-0,5 l/ha**	két leveles állapottól a teljes érésig (BBCH 12-89) januártól decemberig
paprika (zárt termesztő berendezés)	paradicsommoly, bagolylepkék, aknázólegyek, uborka-levéltetű, dohánylisztéke, üvegházi molytetű, nyugati virágtripsz, dohánytripsz	4	7	**0,375-0,5 l/ha**	két leveles állapottól a teljes érésig (BBCH 12-89) januártól decemberig
paradicsom, tojásgyümölcs (zárt termesztő berendezés)	paradicsommoly, bagolylepkék, aknázólegyek, uborka-levéltetű, dohánylisztéke, üvegházi molytetű, nyugati virágtripsz, dohánytripsz	4	7	**0,375-0,5 l/ha**	két leveles állapottól a teljes érésig (BBCH 12-89) januártól decemberig

Előírt növényvédelmi technológia:

Szabadföldi szamócában a szamóca-bimbólikasztó ellen csepegtető öntözéssel kell kijuttatni a készítményt a gyökerek közelébe az öntözési periódus első harmadában, a tojásrakás kezdetére időzítve.
Zárt termesztő berendezésben termesztett szamócában talajon, illetve szilárd termesztő közegben történő termesztés során a kártevők ellen előrejelzés alapján és növényvizsgálat ismeretében csepegtető öntözéssel kell kijuttatni a készítményt a gyökerek közelébe az öntözési periódus első harmadában. Vízkultúrás termesztés esetében a tápoldatozásra használt vízbe kell a készítményt egyenletesen bekeverni.
Szabadföldi fejes káposztában, karfiolban, brokkoliban és bimbóskelben a tavaszi káposztalégy ellen a palántákat kell kiültetés előtt felszívatni.
Zárt termesztő berendezésben termesztett uborkában, cukkiniben, sárgadinnyében, görögdinnyében, zöldbabban, fejes salátában, paprikában, paradicsomban és tojásgyümölcsben talajon, illetve szilárd termesztő közegben történő termesztés során a kártevők ellen előrejelzés alapján és növényvizsgálat ismeretében csepegtető öntözéssel kell kijuttatni a készítményt a gyökerek közelébe az öntözési periódus első harmadában. Vízkultúrás termesztés esetében a tápoldatozásra használt vízbe kell a készítményt egyenletesen bekeverni. Az öntözővíz és a tápoldat kémhatását pH 5-6 közé kell beállítani.

Kézi permetező berendezéssel munkaegészségügyi okokból tilos kijuttatni!

Hatásmechanizmus:

A ciántraniliprol hatóanyag az International Resistance Action Committee (IRAC) besorolása szerint az **28** *Rianodin receptor modulátorok* főcsoport *Diamidok* csoportjába tartozik.

A rezisztencia kialakulásának megakadályozása érdekében e készítményt, vagy másik, a diamidok csoportjába tartozó hatóanyagot (pl.: klórantraniliprol, ciántraniliprol, flubendiamid) tartalmazó készítményt ne alkalmazza egymás után, eltérő hatásmechanizmusú, más inszekticiddel való kezelés útján történő megszakítás nélkül.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Az alábbi mondatokat kötelező feltüntetni a címkén:
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait. **Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!** **Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199,** **CSEBER Nonprofit Kft.** növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a **http://www.cseber.hu** címen **A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!**

GYÁRTÓI AJÁNLÁS

A készítmény kontakt, felszívódó és gyomormméreg az antranil diamid csoportba tartozik. Rianodin receptor modulátor hatása révén a rovarizom bénítása révén fejti ki hatását. Felszívódó hatásmechanizmusa alapján a lárvák táplálkozását gátolja, és tojásölő hatással is rendelkezik. A kezelt petékből és tojásokból a lárva nem képes kikelni, a kelés pillanatában a hatóanyaggal érintkező lárvák néhány óra múlva elpusztulnak. Tünetek: Paralízis, táplálkozásgátlás, teljes pusztulás. A tünetek: bénultság és táplálkozásgátlás néhány órával a kezelés után jelentkeznek, a teljes pusztulás 2-4 nappal a kezelés után megtörténik.

Előrejelzés: A kártevőket és fejlődésüket állandóan figyelje (szexferomon, fénycsapdás előrejelzés és növény megfigyelés), hogy a permetezést a leghatékonyabban, és a kártevők érzékeny fejlődési állapotában tudja kivitelezni, figyelembe véve a helyi sajátosságokat és környezeti tényezőket.

Keverhetőség:

A **Verimark**® tankkeverékben általában felhasználható az engedélyezett kultúrákban felhasználható engedélyezett készítményekkel, de tankkeverék készítésekor (termékkombináció), keverhetőség szempontjából mindig kérje ki a kombinációs partner gyártójának véleményét is.

Szelektivitás:

A **Verimark**® felhasználása nem javasolt olyan kultúrában, amely szárazság, vízállás, alacsony hőmérséklet, rovarkártétel, tápanyag- vagy mészhiány, vagy egyéb a növény növekedését akadályozó tényezők miatt stressz állapotba került.

A készítmény ne kerüljön a kezelt területen kívülre, illetve folyóvizekbe, állóvizekbe, csatornákba, vagy szomszédos kultúrákra.

Elsodródást okozó széljárás esetén az öntözéses technológia alkalmazása tilos!

Permetlé készítés:

Mielőtt a permetlevet készíti, a permetezőgépet alaposan tisztítsa ki.

A permetlevet a következők szerint készítse el.

- töltse meg a tankot 1/3 részig vízzel,
- indítsa el a keverőt,
- mérje a kívánt mennyiségű **Verimark**® készítményt a tartályba,
- folyamatos keverés mellett töltse meg vízzel a tartályt, és adja hozzá a kimért kombinációs partnert.

A permetezés alatt folyamatosan működtesse a keverő berendezést.

Az elkészített permetlevet lehetőleg még aznap juttassa ki.

Permetezőgép tisztítás:

A permetezést jól karbantartott és tisztára kimosott permetezőgéppel végezze.

A kijuttatás után azonnal mossa ki a permetezőt, hogy elkerülje a nehezen eltávolítható lerakódások képződését.

A permetezés befejezése után azonnal ürítse ki a tankot!

A szórófejeket, szűrőket távolítsa el, és úgy tisztítsa meg!

Az egész rendszert mossa át tiszta vízzel!

Minden berendezést és eszközt mosson ki.

A permetezőgép tisztítása során használja az előírt védőfelszerelést!

Ne végezze a tisztítást kutak és víznyerő helyek közelében.

A mosóvíz kezelésére az érvényes szabályok az irányadók.

Korlátozások:

A **Verimark**® csak az engedélyokiratban leírt területeken és kultúrákban használható.

A **Verimark**® csak a címke utasításai szerint leírtaknak megfelelően használható!

Rezisztencia:
Néhány rovarfaj esetében rezisztencia alakult ki néhány, a gyakorlatban használt és beszerezhető készítménnyel szemben. Amikor rezisztencia fejlődik ki egy hatóanyaggal szemben, akkor a készítmény javasolt dózisa már nem képes a kártevőt a gazdasági kártételi szint alatt tartani. Ilyen esetben, illetve ilyen esetek megelőzésére rezisztencia kezelési és megelőzési programot szükséges alkalmazni.

Mivel a ciántraniliprol - **Verimark®** - egyedülálló hatásmóddal rendelkezik, kiválóan alkalmas olyan esetekben is, ahol a rezisztencia elkerülése és megelőzése fontos. Ciántraniliprollal szemben rezisztencia nem ismert, a következő irányelvek betartásával a rezisztencia kialakulásának veszélye minimálisra csökkenthető.

1. Ahol lehetséges váltogassa a különböző hatásmódú készítményeket: karbamátok, piretroidok, szerves foszforsav származékok, acilurea származékok.
2. Folyamatosan figyelje a rovar populációt, és akkor permetezzen, amikor helyileg a gazdasági - minőségi kártételi küszöböt a kártevő populációja elérte.
3. Mindig tartsa be a készítmény címkéjén előírtakat - dózis, időzítés, permetezési fordulók.
4. Azonos hatásmechanizmusú készítményeket ne használjon a növénykultúra vegetációs idejének több mint felében. Olyan növénykultúra esetén, ahol a vegetációs idő rövidebb, mint 50 nap, havonta eltérő hatásmechanizmusú készítményt használjon.
5. **A Verimark®** - ciántraniliprol - megkíméli a hasznos ragadozó rovarokat, így azok a kezelés után megmaradva segítik a kártevők alacsony szinten tartását, ezáltal kevesebb kezelésre lehet szükség.

Integrált növényvédelmi technológia
A termék beilleszthető az integrált növényvédelmi technológiába, ami magába foglalja a preventív biológiai, agrotechnikai beavatkozásokat a korrekt betegség és kártevő felismerést és megfigyelést, valamint az optimális időben végzett célzott kezelést, amikor a kártételi küszöb-megkívánja.

Utóveteményhatás: nincs
Hasznos élő szervetekre való hatás:
Széleskörű laboratóriumi és szabadföldi kísérletek igazolják, hogy a ciántraniliprol hatóanyag nem veszélyes a legtöbb hasznos rovarra, mint a ragadozó atkák, ragadozó tetvek, bogarak, fürkészek, mint pl. a *Typhlodromus pyri*, ragadozó atkák, és a *Syrphus* fürkész fajok.

*A **Verimark®** a permettel közvetlenül érintkező mézelő méhekre toxikus, ezért a méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!*

Csomagolóanyag kezelés:
Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát folyókba, vízfolyásokba, víztározókba, állóvizekbe juttatni!
A kiürült csomagolóanyagot háromszor ki kell öblíteni és a mosólevet a permetléhez adni. Az üres csomagolóanyagot a magyar előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.
Tilos a csomagolóanyag bármilyen célú újrafelhasználása!

Raktározás:
Tartsa a készítményt jól szellőző raktárban, eredeti, zárt csomagolásban.
Védje a fagyhatástól, illetve a magas hőmérséklettől!
Ne használja, vagy raktározza a készítményt lakóhelyén, vagy annak közvetlen közelében.

Figyelmeztetés:
Az **FMC** garantálja, hogy e termék azonos a használati utasításban leírtakkal és normál felhasználási viszonyok között megfelel a leírt céloknak. Fitotoxicitás, hatáscsökkenés vagy más, nem szándékolt

eredmény bekövetkezhet olyan tényezők miatt, mint: időjárás, más anyagok jelenléte vagy a kivitelezés módja, mely tényezők kívül esnek az **FMC** kontrolján és felelősségén.

A Verimark® készítményt csak ezen címkének megfelelően javasolt felhasználni.
Az **FMC** nem vállal felelősséget semmilyen, a termék – az **FMC** ajánlásaitól eltérő - felhasználásából következő kárért, vagy károsodásért.
Ez esetben a felelősség a felhasználót terheli.

® *az **FMC Corporation vagy leányvállalatainak** bejegyzett márkaneve*

400 ML/G ALATTI KISZERELÉSEK ADATKÖVETELMÉNYE

Azonosítási adatok	**Címkén feltüntetendő kifejezések és információk** tartalmi, ill. formai követelményei
Növényvédő szer neve és szerforma	**VERIMARK** szuszpenzió koncentrátum **(SC)**
Hatóanyag megnevezése, koncentrációja (g/l, vagy g/kg és ez tömegszázalékban is kifejezve; m/m%)	**ciántraniliprol** 200 g/l, (18,7 % m/m)
Rendeltetése	rovarölőszer
Engedély száma:	**6300/13566-1/2019. NÉBIH**
Engedély tulajdonosa és forgalmazó	**Engedélytulajdonos és forgalmazó:** **FMC-Agro Hungary Kft.** 1027 Budapest, Ganz utca 16. Tel.: +36 1 336 2120
Gyártási idő (nap, hó, év)	**Gyártási idő: (nap/hó/év)** A csomagoló burkolaton található.
Gyártási szám	Gyártási szám: a csomagolóburkolaton található
Veszélyt jelző piktogramok és Figyelem/Veszély	 **Figyelem**
Eltarthatóság (eltér az engedélyokiratban szereplő szövegtől, ezt kérjük használni)	**Eltarthatóság:** Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3** év.
Kiszerelési egység	100 ml, 250 ml,
Forgalmi kategória	**Forgalmi kategória: II.**
Használat előtt olvassa el a mellékelt tájékoztatót!	