

Korai gyomok ellen korai védelem

SZERZŐ: FMC-AGRO HUNGARY KFT.

„Ki korán kel, aranyat lel” – tartja a mondás, és ez átvitt értelemben igaz lehet az idei kalászos gabonák gyomirtásával kapcsolatban is. Az elhúzódó nedves, csapadékos őszi/téli időjárás ugyanis nemcsak a kalászosok, de a talajban lévő egyéb gyommagok kelésének is rendkívüli mértékben kedvezett.

Azok a T1, T2 életformájú gyomok, amelyek az utóbbi években már egyébként is fokozott mértékben jelentkeztek, most még zavaratalanabban, már az őszi kalászosokkal egy időben kikeltek. Ilyen például a pásztortáska, veronika- és violafajok, mezei árvácska, tyúkhúr stb.

Szerencsére van olyan gyomirtó hatóanyag, amely eredményesen alkalmazható a kalászos gabonák korai gyomosodása ellen is. Ez a karfentrazon-etil, amely az **AURORA® 40 WG** hatóanyaga.

A karfentrazon-etil egy ún. protox-inhibitor, melynek hatására perzselés tünetei mellett pusztulnak el a gyomnövények.

Gyomirtó hatása gyors, hidegben is működik, és nincs káros hatással az utóvetemény növényre.

Sajnos azonban már ebben az időszakban is vannak olyan gyomok is, amelyek ellen ez a hatóanyag nem ad megfelelő védelmet, ilyen például a mezei acat vagy az ebszékfűfajok.



Borostyánlevelű veronika őszi búzában (Gölle, 2020. 03. 20.)



Ebszékfű (*Matricaria spp.*) gyomkelés őszi búzában (Tiszalúc, 2021. 01. 05.)



Az Aurora® Gold teljes hatása facélia-árvakelés ellen (Martonvásár, 2020. 03. 26.)

A hatáskiegészítés tökéletesítése céljából született meg az **AURORA® GOLD** kalászosgyomirtás-technológiai ajánlat, amely kereskedelmi csomagban a rendkívül széles hatásspektruma és korai alkalmazhatósága mellett versenyképes árral is rendelkezik.

Az **AURORA® GOLD** 100 g Aurora® 40 WG és 100 g Granstar® Super 50 SX® kombinációja, amely 40 + 40 g/ha-os dózissal 2,5 ha kalászos gabona gyomirtására elegendő. Alkalmazása egyszerű: időben rendeljék meg, töltsék be a tartályba, és ne keverjék semmi mással! Különösen kerüljük a folyékony műtrágyák, nedvesítőszere-

rek, lombtrágyák, gombaölő szerek hozzáadását!

A kijuttatáskor törekedjünk a minél tökéletesebb permetléborításra, tehát nagyobb lémenyiséggel (300 l/ha vízzel), jól porlasztva, lehetőleg napos időben permetezzük ki! A várt hatás néhány napon belül jelentkezik.

www.fmcagro.hu

A növényvédő szereket biztonságosan és felelősséggel használja! Kérjük, mindig kövesse a készítmény címkéjén leírtakat annak alkalmazásakor! Az ® jellel jelölt termékek az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkanevei.